

INDICACIONES POSTOPERATORIAS

BLEFAROPLASTIA

- Dieta blanda.
- Cama en 45° durante las primera 24hs.
- Colocar 1 gota de alcòn lágrimas en cada ojo cada 2hs por 48hs.
- Se puede bañar a las 24hs y lavarse el pelo con shampoo.
- Importante el hielo local por 24hs, una forma práctica es utilizar té frío de manzanilla con hielo y humedecer paños que luego son colocados en forma intermitente sobre los ojos.
- Se recomienda no mirar televisión ni leer en las primera 24hs.
- Como norma general, evite realizar esfuerzos durante los primeros 15 días.
- Ciertas molestias, hinchazón , o la aparición de hematomas suelen ser normales; sin embargo no deje de consultar ante la aparición de algunos de estos síntomas.
- Antibiótico (*): **CEFACAR 500 mg.** 1 comprimido cada 12 hs por 7 días completos.
- Analgésico (*): **IBUPIRAC 600 mg.** 1 comprimido cada 8 hs.
(*) El pedido médico será entregado oportunamente.
- Si presenta algún tipo de alergia con respecto a los medicamentos por favor indicársela a los médicos.
- Control en Ce.De.Ba: ___/___/___
(confirmar horario con las secretarias – TE: 4312-3725)
- Dr. Andrés Castro 154403-0100